

荔枝主要病虫害防控安全用药明白纸

按县级植保部门发布的荔枝病虫发生预报，在蒂蛀虫成虫高峰期、卵孵高峰期、霜疫霉病发生初期科学用药。

- 荔枝易超标农药：吡唑醚菌酯、高效氯氟氰菊酯、高效氯氟菊酯、顺式氯氟菊酯、氯氟菊酯、溴氟菊酯、除虫脲、苯醚甲环唑、多菌灵（以多菌灵表示的残留物包含甲基硫菌灵和多菌灵）、毒死蜱。超量、超频使用是上述农药易超标的主要原因。
- 使用易超标农药时，需按照产品标签上的**每季最多使用次数**和**用量**使用，并严格遵守**安全间隔期**（指从最后一次施用农药到荔枝采收上市之间必须经过的时间），避免超频和超量使用。
- **登记在荔枝上的杀虫剂**

防治对象	农药名称	用量（倍）	安全间隔期(天)	每季最多使用次数(次)
荔枝蒂蛀虫	2% 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂	890-1140	7	1
	200克/升四唑虫酰胺悬浮剂	3000-5000	10	2
	6%阿维·氯苯酰悬浮剂	1000-4000	10	2
	200克/升氯虫苯甲酰胺悬浮剂	3000-6000	10	1
	85%氯虫苯·杀虫单悬浮剂	2000-3000	10	2
	4.5%高效氯氟菊酯乳油	65-85毫升/亩	14	3
	25克/升高效氯氟菊酯乳油	1000-2000	14	2
	50克/升顺式氯氟菊酯乳油	1000-1500	14	3
	8%高效氯氟菊酯·虱螨脲乳油	1000-1300	14	2
	19%氯氟·虱螨脲悬浮剂	4500-6500	14	1
	10%高氯·吡丙醚微乳剂	1000-2000	14	2
	19.9%甲维·除虫脲悬浮剂	2500-3500	14	1
	12%除虫脲·氯虫苯甲酰胺悬浮剂	1000-1500	14	2
	20%联苯·除虫脲悬浮剂	1000-2000	21	2
	40%毒死蜱乳油	800-1000	21	3
荔枝蜡象	40%除虫脲悬浮剂	2000-4000	21	2
	25克/升高效氯氟菊酯乳油	2000-4000	7	2
	50克/升顺式氯氟菊酯乳油	2000-2500	14	3
	16%氯氟·马拉松乳油	1500-2000	14	3
	25克/升溴氟菊酯乳油	3000-5000	28	3

● 登记在荔枝上的杀菌剂

防治对象	农药名称	用量（倍）	安全间隔期(天)	每季最多使用次数(次)
霜疫霉病	84%王铜水分散粒剂	1000-1500	-	-
	86.2%氧化亚铜水分散粒剂	1000-1500	-	-
	23.4%双炔酰菌胺悬浮剂	1000-2000	3	3
	68%精甲霜·锰锌水分散粒剂	800-1200	7	3
	280克/升氟噻唑·双炔酰悬浮剂	2000-2500	7	2
	100克/升氟霜唑悬浮剂	2000-2500	7	4
	80%代森锰锌可湿性粉剂	400-600	10	3
	66%精甲霜灵·氧化亚铜可湿性粉剂	1000-1500	14	3
	31%噁唑·氟噻唑悬浮剂	1800-2400	14	2
	33.5%唑啉铜悬浮剂	1000-1500	14	3
	250克/升啉菌酯悬浮剂	1200-1600	14	3
	60%吡唑·代森联水分散粒剂	1000-2000	14	3
	47%烯酰·啉菌酯悬浮剂	1000-2000	14	3
炭疽病	10%苯醚甲环唑水分散粒剂	650-1000	3	3
	40%腈菌唑可湿性粉剂	4000-6000	7	3
	43%氟菌·肟菌酯悬浮剂	1500-2000	14	2
	325克/升苯甲·啉菌酯悬浮剂	1500-2000	21	3
	400克/升氯氟醚·吡唑酯悬浮剂	1500-3000	21	3
	25%咪鲜胺乳油	1000-1200	21	3