

普宁市广太镇人民政府用笺

转发关于做好 2026 年晚稻南方水稻黑条矮缩病 防控技术指导的通知

各村委会：

现将普宁市农业农村局《转发关于做好 2026 年晚稻南方水稻黑条矮缩病防控技术指导的通知》转发给你们，请各村结合种植实际情况，抓紧落实各项防控措施，压实防控责任，保障晚稻稳产丰收。

附件：转发关于做好 2026 年晚稻南方水稻黑条矮缩病防控技术
指导的通知



普宁市农业农村局

转发关于做好 2026 年晚稻南方水稻黑条矮缩病 防控技术指导的通知

各乡镇人民政府、街道办事处、农场：

南方水稻黑条矮缩病通过白背飞虱传毒，威胁晚稻生产。7 月 1 日-7 月 20 日测报灯监测显示，我市白背飞虱迁入虫量偏高，其中和寮村监测点诱获 165 头、青洋山村监测点诱获 1045 头；晚稻南方水稻黑条矮缩病发病风险较大。

为筑牢粮食安全防线，严防病害暴发流行，现将省农业有害生物预警防控中心防控指导文件转发你们，请抓紧落实各项防控措施。一是抓实秧田防控，做好种子处理，按时喷施送嫁药，清除周边杂草，实现秧苗零带毒移栽。二是紧盯大田关键期，分蘖至孕穗期对照飞虱防治指标精准施药，轮换药剂喷水稻基部，及时拔除病株减少毒源。三是强化监测宣传，常态化开展田间病虫害巡查，发现险情即时上报并快速处置；多渠道普及防治技术，规范施药并严守农药安全间隔期。

请各地结合种植实际细化工作，压实防控责任，保障晚稻稳产丰收。

附件：《关于做好 2026 年晚稻南方水稻黑条矮缩病防控技术指导的通知》



广东省农业有害生物预警防控中心

关于做好 2026 年晚稻南方水稻黑条矮缩病 防控技术指导的通知

各地级以上市，县(市、区)植保植检(预警防控、农技推广、农业科技促进、农业农村综合服务、农产品质量安全)站(中心)：

当前正值“双抢”关键时期，据近期监测结果显示，6月底粤北中稻田南方水稻黑条矮缩病病株率为2%~5%，病田中白背飞虱成虫带毒率28.2%，为周边晚稻秧苗提供了充足的潜在毒源，预测我省北部晚造南方水稻黑条矮缩病中等发生，少数田块病株率可能超过70%。为保障粮食安全，切实做好2026年晚稻南方水稻黑条矮缩病防控技术指导工作，现将有关事项通知如下，请结合当地实际，认真抓好落实。

一、防控策略

坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，贯彻“治虫防病、治秧田保大田、治前期保后期”的防控策略。重点抓好秧田期和分蘖期两个关键窗口期，秧田期通过防虫网覆盖、种子处理、送嫁药施用等措施，确保秧苗“零带毒移栽”。本田期依据监测预警达标用药，精准施治，及时拔除病株并妥善处理，清除田间毒源，防止白背飞虱二次带毒传播，降低病毒侵染风险，保障晚稻生产安全。

二、防控重点

重点抓好粤北中稻区及历年重发区域晚稻的防控技术指导工作，兼顾其他轻发区监测预警；对监测到灯下白背飞虱带毒率大于1%或田间病株率大于3%的稻区，秧田期和分蘖初期须列为重点防控对象，密切监测白背飞虱带毒虫源的迁入动态、田间虫量及灯下带毒率变化，并加强对单双季稻混栽区、靠近玉米田的秧田巡查，确保早发现、早预警、早处置。常发区应全面推行内吸性杀虫剂拌种和带药移栽，选用内吸性长持效期药剂防控白背飞虱，必要时结合使用毒氟磷、宁南霉素等防病毒药剂进行协同防治。

三、防控措施

1. 选用抗(耐)性品种。因地制宜选用抗(耐)性品种，即选择植株茎秆粗壮、抗倒伏性强的水稻品种，缓解白背飞虱对该病毒的传播。

2. 做好种子处理。种子经浸种消毒后，选用吡虫啉、呋虫胺、噻虫嗪等内吸性杀虫剂种子处理剂型进行拌种，充分拌匀后，置于阴凉处摊开晾3-5小时后即可播种。

3. 培育无病秧苗。秧田宜远离感病稻田或玉米田，提倡集中连片育秧，用20-40目防虫网或15-20g/m²无纺布全程覆盖秧田育秧，阻隔介体昆虫传毒。

4. 施用送嫁药。在秧苗三叶一心期或移栽前3天施一次“送嫁药”，药剂可选用三氟苯嘧啶或吡蚜酮，与毒氟磷混合使用；

未种子处理的秧田，于秧苗二叶至三叶一心期及移栽前各喷药一次，秧田周围杂草也同时喷药，药剂可选吡蚜酮或噻嗪酮。

5. 抓好本田防治。水稻移栽后 7 天，结合第 1 次追肥，可根据白背飞虱发生情况撒施噻虫嗪颗粒剂；分蘖期至孕穗期是本田南方水稻黑条矮缩病的防治关键期。防治指标参考田间白背飞虱虫量，并结合灯下白背飞虱带毒率。即带毒率 $< 1\%$ ，每百丛白背飞虱虫量超过 1000 头时进行防治；带毒率 $\geq 1\%$ ，每百丛白背飞虱虫量超 500 头时进行防治。

(1) 治虫防病。移栽后监测灯下白背飞虱带毒率，当带毒率大于 1% ，需进行施药防治，药剂可选三氟苯嘧啶或烯啶虫胺，注意对准水稻基部喷雾。注意交替用药，延缓抗药性。

(2) 拔除病株。移栽时剔除疑似病株，田间发现感病植株要及时拔除或踩入泥中，减少本田毒源，并从健株上掰蘖补苗，保证有效分蘖数；重病田及时翻耕改种。

(3) 施用抗病毒剂。历史发病稻田可在发病前或发病初期施用毒氟磷、宁南霉素等防病毒药剂，间隔 7-10 天，连续施用 2-3 次，起到预防控制作用；分蘖拔节期发病，可施用赤·吲乙·芸苔等植物生长调节剂或氨基寡糖素等植物诱抗剂；促进水稻分蘖，提高稻株抗逆性和自我补偿能力，减少产量损失。

四、注意事项

1. 科学用药，轮换交替。白背飞虱已对部分药剂产生抗性，要暂停使用噻嗪酮，并避免长期单一使用同类型药剂。每季水稻

使用毒死蜱、噻虫嗪不超过1次；轮换交替使用三氟苯嘧啶、烯啶虫胺、氟啶虫胺胍等药剂。

2. 规范施药操作。喷药时对准水稻基部和叶鞘部位，确保药液覆盖飞虱主要栖息位点。

3. 执行安全间隔期。严格遵守农药使用操作规程，执行农药安全间隔期，确保稻米生产安全和质量安全。

4. 加强监测与信息报送。各地植保机构应加强灯下白背飞虱虫量和带毒率监测，及时发布病虫情报，指导农户适期防治。发现异常高虫量或疑似暴发趋势，应第一时间上报上级业务部门。

5. 做好宣传培训。利用现场会、广播、微信群等方式，将防控技术传达到基层农户，确保各项措施落到实处。

