

广东省爱国卫生运动委员会办公室

广东省爱国卫生运动委员会办公室转发 全国爱卫办关于开展 2026 年夏秋季 爱国卫生运动的通知

各地级以上市爱卫会，省爱卫会成员单位：

为深入贯彻习近平总书记关于爱国卫生运动重要指示精神，贯彻落实推进健康广东建设的部署要求，现将《全国爱卫办关于开展 2026 年夏秋季爱国卫生运动的通知》（全爱卫办发〔2026〕4 号）转发给你们。各地、各单位要落实属地责任、行业管理职责，结合城中村等重点区域爱国卫生百日攻坚行动，大力开展夏秋季爱国卫生运动，积极开展健康科普宣传，广泛发动社会力量，深入推进城乡环境综合整治，按照《洪涝灾害灾后爱国卫生运动工作要点》及时做好灾后爱国卫生活活动，全面清理蚊虫孳生地，建设城乡健康环境，助力传染病防控工作。请结合实际抓好落实，及时总结和推广好经验、好做法。

附件：全国爱卫办关于开展 2026 年夏秋季爱国卫生运动的
通知（全爱卫办发〔2026〕4 号）

广东省爱国卫生运动委员会办公室

2026 年 7 月 21 日



附件

全国爱国卫生运动委员会办公室文件

全爱卫办发〔2026〕4号

全国爱卫办关于开展 2026 年 夏秋季爱国卫生运动的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团爱卫办：

当前，全球蚊媒传染病持续高发，登革热、基孔肯雅热、疟疾、埃博拉病毒病等境外输入风险持续走高。我国部分省份汛期降雨偏多、高温时段拉长，蚊虫孳生条件充足，多地存在输入疫情引发本地传播隐患。此外，暴雨、台风等自然灾害易造成积水积污、环境脏乱，大幅提升肠道传染病等暴发风险。为深入贯彻习近平总书记关于爱国卫生运动重要指示精神，贯彻落实推进健康中国建设的部署要求，持续改善城乡环境卫生面貌，助力传染病防控工作，全国爱卫办决定开展 2026 年夏秋季爱国卫生运动。现就有关要求通知如下：

一、开展蚊虫孳生地清理活动

各地要坚持“环境治理为主、物理与生物防制为辅、必要时采取化学防治”的综合预防控制策略。结合本地实际,组织开展全域积水清理整治,全面清理废旧轮胎、景观水池、沟渠洼地、工地基坑、地下车库、苗圃容器等各类积水;引导群众定期清理花盆托盘、闲置容器等居家积水,翻盆倒罐、户户自清,从源头阻断蚊虫繁殖。鼓励重点场所和家庭安装纱窗、纱门、防蚊帘等物理防护设施,引导群众外出时穿浅色长袖衣裤,裸露皮肤处使用蚊虫趋避剂。指导强化消杀队伍建设,规范使用低毒环保消杀药剂,减少环境污染。

各省级爱卫办要密切关注辖区范围内蚊媒密度监测结果,及时组织清理各类蚊媒孳生地,一旦发生登革热、基孔肯雅热等蚊媒传染病疫情,积极指导当地开展防蚊灭蚊行动,有效降低疫情传播扩散风险。

二、开展灾后爱国卫生活动

针对暴雨、台风等自然灾害,各地要按照《洪涝灾害灾后爱国卫生运动工作要点》、《洪涝灾害灾后卫生防疫技术指南(2024版)》(国疾控综应急函〔2024〕192号)等要求,结合本地气候、水文、地质特点,广泛深入开展爱国卫生运动,协同落实灾后卫生防疫工作。提前制定完善灾后爱国卫生工作方案,开展防灾防疫知识培训,充分发挥村(居)民委员会公共卫生委员会、网格员、家庭

健康指导员、志愿服务队伍作用,做好应急清洁小分队组建准备。灾害发生后,充分运用爱国卫生工作机制,协同相关部门部署落实环境卫生整治、健康科普和宣传教育、健康防护等,引导群众主动参与房前屋后排涝清污、积水容器清理等工作,落实居家防护措施,构建协同共治、专群结合、群防群控的工作格局。

三、开展城乡环境卫生整治活动

各地要结合全国健康城镇创建工作,定期开展城乡环境卫生整治活动,消除卫生盲区死角,持续改善人居环境。城市地区要重点整治城中村、老旧小区、背街小巷、城乡结合部、垃圾中转站、公共厕所等场所,清理整治乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒等现象,健全常态化保洁管护机制。农村地区要持续推进生活垃圾收运处置、污水治理,清理房前屋后杂草杂物、坑塘沟渠,做好畜禽圈舍卫生整治。市场商超、交通场站、酒店、文体场馆等人员密集场所要落实每日清扫保洁,定期开展环境消杀,保持卫生干净整洁。

四、开展健康科普促进活动

各地要围绕防蚊灭蚊、登革热和基孔肯雅热疫情防控、防灾减灾、防暑降温、食品安全、饮用水卫生、应急救护等主题,开展形式多样、贴近生活的健康科普促进活动,引导群众增强自我防护意识、积极参与疾病防控,全面提升传染病防控和应急处置能力。围绕健康体重管理、控烟限酒、无偿献血等,常态化开展宣传教育,倡

导“每个人是自己健康第一责任人”理念，持续提高全民健康素养。全国爱卫办正在组织制作洪涝灾害等系列科普长图，将另行发送，供各地使用。

各省级爱卫办要统筹爱卫会相关成员单位落实行业管理职责，督促辖区各地落实属地责任，上下联动、齐抓共管、协同配合，认真开展夏秋季爱国卫生运动。深入总结本地工作的经验做法，及时报送全国爱卫办，全国爱卫办将适时以工作简报、经验交流等形式宣传推广。

附件：1. 洪涝灾害灾后爱国卫生运动工作要点

2. 基孔肯雅热和登革热蚊媒防控科普要点

3. 一图掌握登革热防控指南（见国家卫生健康委官网）



（信息公开形式：依申请公开）

附件 1

洪涝灾害灾后爱国卫生运动工作要点

一、环境卫生

(一)室外环境清理。对过水村屯、内涝和被水淹村屯,待洪水过后应及时清淤,修整厕所、牲畜圈,修整院庭、填平坑洼,清除游积在户外易腐烂变质的动物尸体和植物。动物尸体应深埋,土层应夯实。

(二)居住环境清理。大力开展群众性爱国卫生运动,改善居住环境卫生。及时清理积水和淤泥,清除粪便、垃圾,减少蚊蝇孳生;及时对房屋进行彻底清理,做到先清理、后消毒、再回迁。

(三)粪便无害化处理。优先修复使用原有粪便处理设施和卫生厕所。设置的临时厕所应便于使用、远离水源、位于临时安置点的下风向。定期使用生石灰或含氯消毒剂对临时厕所内粪便及其周围环境进行消毒处理,保持厕所内清洁卫生,无蛆蝇孳生。有条件可选择移动式厕所。安置点长期使用时,应建设无害化卫生厕所。

(四)生活垃圾污水收集处理。设置临时垃圾收集点,垃圾集中堆放,及时消毒与清运,做到日产日清,减少病媒孳生。禁止乱倒垃圾、污水,保持环境卫生。及时修复污水、雨水等排水系统和生活污水处理设施。

(五)供水设施处理。待洪水过后,先清出被淹没或损坏的供

水设施内的淤泥,清洗并排空污水,对管道进行彻底清洗和消毒,待各项指标检查合格后方可启用供水。在管道清洗消毒过程中要提醒受灾群众不要使用自来水作为饮用水。被水淹或损坏的水井修复后必须进行清掏、冲洗与消毒。运转正常的自来水厂应根据源水水质变化情况,及时使用或加大混凝剂和消毒剂的使用量。

(六)发现传染病病例后的环境治理。

1. 肠道传染病。重点开展灭蝇并对水井、自来水等进行严格消毒。对厕所粪便进行消毒或无害化处理,防止污染饮用水水源和食物。严格管理受灾地区家禽、家畜,实行圈养。

2. 自然疫源性传染病。重点开展防蚊灭蚊、防鼠灭鼠、清理蚊蝇孳生地(猪圈、马厩附近的蚊虫孳生地),可采用杀灭、防止侵袭、驱避、改造生态环境等策略。管好家畜传染源(猪、犬和牛等),不让粪尿液直接流入水中,对粪尿要进行无害化处理才能施用。提倡圈养猪,搞好猪舍卫生。将家畜用水池塘与人用池塘分开等。

3. 呼吸道传染病。强化通风措施,做好公共区域和高频接触物体表面清洁和消毒,加强手卫生管理,有发热、乏力、干咳等症状时要及时就医排查。

二、病媒生物防制

做好蚊、蝇、鼠等病媒生物防制组织工作,安排专人负责,做好杀虫灭鼠药物的集中管理、合理配置、及时分发和回收工作。

(一)环境治理。环境治理是水灾后病媒生物预防控制最有效的措施之一。水灾发生时,应及时开展环境治理,清除积水,生活垃圾集中堆放。完善防蚊蝇设施,在住所安装纱门纱窗,使用

蚊帐。

(二)蚊虫防制。对于无法清除的各类积水,可每周 1 次投放灭蚊幼剂杀灭蚊幼虫。当蚊虫密度较高时,对居民区、草丛等外部环境采用空间喷雾处理杀灭成蚊。对住所、垃圾站、地下室等蚊虫易孳生场所采用滞留喷洒处理墙面杀灭成蚊。除在临时安置点或住所室内环境进行滞留喷洒处理外,必要时还可睡前点燃蚊香或使用电热蚊香。

处理积水时,按 2—5 克/平方米投放杀蚊幼颗粒剂,手工施洒或机动喷粉机喷洒,每 1—2 周投 1 次。对居民区、绿地等外环境处理时,采用 S—生物烯丙菊酯和氯菊酯水乳剂按 1.3 毫克/立方米进行超低容量空间喷雾处理。对住所、垃圾站、地下室等蚊虫易孳生场所处理时,采用顺式氯氰菊酯悬浮剂,按 10—20 毫克/平方米滞留喷洒处理墙面。

(三)蝇类防制。当蝇类密度较高时,对垃圾堆、厕所等蝇类孳生场所外环境采用空间喷雾处理杀灭成蝇。对住所、垃圾站、地下室等场所室内环境采用滞留喷洒处理墙面杀灭成蝇。

对垃圾堆、厕所等外环境处理时,采用 S—生物烯丙菊酯和氯菊酯水乳剂按 1.3 毫克/立方米进行超低容量空间喷雾处理。对住所、垃圾站、地下室等场所处理时,采用顺式氯氰菊酯悬浮剂,按 10—20 毫克/平方米滞留喷洒处理墙面。

(四)鼠类防制。对居民区、垃圾堆、废墟等重点防鼠场所,投放蜡块毒饵。毒饵应投放于垃圾、废墟等隐蔽区域,或直接投入鼠洞;居住区周围应投放于毒饵盒内。

对居民区、垃圾堆、库房等重点防鼠场所，室内每 15 平方米 1 堆，室外 5—10 米 1 堆，每堆 10—15 克，使用二代抗凝血蜡块毒饵，可使用毒饵盒或临时毒饵盒。

(五)蚤类防制。灭鼠时，应在居住区喷洒杀虫剂，消灭离开鼠体的游离蚤。灭蚤前应先清理环境和鼠尸，再施药灭蚤。可使用杀虫剂喷洒卧室、床铺、被褥、沿墙地面及缝隙、牲畜圈等，喷洒方法可以针对以上环境表面进行常量喷洒或滞留喷洒。

表面常量喷洒使用甲基嘧啶磷乳油，按 500 克/公顷，用水进行稀释后进行表面喷洒。滞留喷洒使用顺式氯氰菊酯悬浮剂，按 10—20 毫克/平方米滞留喷洒处理墙面。

(六)注意事项。

1. 高温高湿容易发生农药中毒事件，施药人员应重视个人防护，科学使用防护服、眼罩、口罩、手套、防护袜、防护面具、工作鞋等，避免中毒。

2. 灭鼠工作需要严格组织下实施，根据鼠情决定毒饵投放量，投饵工作要由受过培训的专业人员实施；投饵点应设置在儿童不易接触到的位置，且应有醒目标记以防误食；投药后及时搜寻死鼠，灭鼠结束还应收集剩余毒饵，集中进行无害化处理；医疗卫生机构要储备一定的维生素 K1 解毒剂，做好中毒急救的准备。灭鼠工作开展前应做好宣传、告知。

3. 在蚊虫较多的地方活动或工作，应使用驱避剂等个人防护用品，按照产品说明上的使用剂量、使用频次涂抹于皮肤外露的部位。

三、健康科普

重点普及以下健康知识：

(一)手卫生。准备食物前、饭前、便后、护理病人前后、接触动物或动物尸体后、接触垃圾后、处理伤口前等情况下,均需要洗手。洗手时,最好用肥皂和流动水清洗,并及时擦干。不可以用被洪水污染的水洗手洗脸,以及洗涤其他物品。

(二)饮用水卫生。不喝生水,尽量喝烧开水、符合卫生标准的瓶装水、净化设备现场制备或送来的桶装水。不喝来源不明或被污染的水,不用来源不明或被污染的水漱口、洗菜等。装水器具必须干净,并经常倒空清洗、消毒,消毒后用干净的水冲洗。对井水、河水、湖水、塘水等,一定要进行净化消毒后再使用。自来水水管或水龙头如被污染,退水后应对管路充分清洗消毒后再使用。自觉保护生活饮用水水源及环境,在指定地点堆放生活垃圾、倾倒生活污水和粪便。

(三)食品卫生。不吃腐败变质、霉变和受污染的食物,不吃来路不明的食品,不吃被污水浸泡过的食物;不吃淹死、病死的禽畜;不生吃水产品 and 生冷食品。食物要煮熟煮透,生熟分开,生吃瓜果蔬菜时一定要用洁净水洗干净。建议只加工简单的饭菜,即做即食,不存放,尽量不吃剩饭剩菜。必要时,剩饭菜、隔夜熟食在确定没有变质的情况下,经彻底加热后再食用。食品容器、餐具须彻底清洁并消毒后使用。

(四)病媒生物控制方法。粪缸、粪坑中加药杀蛆,室内用苍蝇拍灭蝇,食物用防蝇罩遮罩。使用蚊帐、驱虫剂,防止蚊虫叮咬及

各种皮肤感染。使用粘杀、捕杀等方式灭鼠，不吃被老鼠咬过的食物。

(五)洪涝灾害所及的血吸虫病流行区及其水系相通地区个人防护。尽量避免接触流行区有螺环境或可疑环境的自然水体，对因生产生活、抗洪救灾等必须接触水体的人群，要采取必要的防护措施，涂抹防护油膏或穿戴防护用具。接触疫水后若出现发热、腹泻等症状，应主动到医院或血吸虫病防治机构告知接触史并进行检查，发现感染应尽早治疗。

(六)个人健康监测。出现发热、腹泻、皮疹、结膜红肿、呕吐等症状时，要尽快寻求医生帮助，遵从医嘱，合理用药，必要时配合进行传染病隔离。

有关技术要点参见《病媒生物应急监测与控制 水灾》(GB/T 28944—2012)和国家疾控局印发的《洪涝灾害灾后卫生防疫技术指南(2024 版)》(国疾控综应急函〔2024〕192 号)中的《洪涝灾害临时安置点卫生管理》《洪涝灾害饮用水卫生和环境卫生技术指南》《洪涝灾害病媒生物监测与控制技术指南》《洪涝灾害个人防护技术指南》《洪涝灾害灾后疾病防控知识要点》《洪涝灾害灾后健康宣教核心信息》。

附件 2

基孔肯雅热和登革热蚊媒防控科普要点

基孔肯雅热和登革热主要通过伊蚊（如白纹伊蚊、埃及伊蚊）传播，夏季是蚊虫繁殖的高峰期，需从源头控制蚊媒孳生。

一、传播媒介

1. 形态

白纹伊蚊背部有一道明显的白色纵纹，而埃及伊蚊背部有独特的“竖琴”状白色斑纹。

2. 分布区域

白纹伊蚊在我国分布范围较广，而埃及伊蚊仅分布在南方局部地区。

3. 孳生习性

白纹伊蚊和埃及伊蚊都喜欢在小型积水中繁殖，攻击性强，可传播登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒病等多种疾病。

二、清除蚊虫孳生地

1. 清理各类积水

定期检查并清除室内外小型积水，如花盆托盘、瓶罐、冰箱底部接水盘等。

填平坑洼地面，可硬化和疏通排水沟渠，确保无积水。

2. 管理储水容器

蓄水池、水箱等应加盖密封,水生植物容器及时换水并彻底清洗内壁。

废旧轮胎应钻孔排水或遮盖,露天堆放的物品需用防雨布遮盖。

3. 特殊场所处理

竹筒、树洞可用石灰沙或三合土填塞,防止积水。

湖泊、池塘等防止污水流入,定期清理淤泥和杂草,岸边 1 米处深挖以减少蚊虫孳生。

三、环境卫生与设施改造

1. 保持环境清洁

清除垃圾、杂物,减少蚊虫栖息场所。

定期疏通地下室、屋顶的排水系统,防止积水。

2. 优化设施设计

雨棚改为斜坡式,避免积水。

污水井可安装防蚊闸或改造为弯曲管式,防止蚊虫进入。

四、专业灭蚊措施

当室外蚊虫密度较高时,要由专业人员使用“三证齐全”(农药登记证、生产许可证、产品标准证)的卫生杀虫剂,规范开展消杀工作。可采用以下方法:一是空间喷雾,通过专业设备将药剂雾化成微小颗粒,在空中与蚊虫接触,快速杀灭成蚊;二是滞留喷洒,将长

效杀虫剂喷洒在墙面、绿化带等蚊虫栖息处，达到持久灭蚊的效果。

五、个人防护措施

外出时穿浅色长袖衣裤，使用含避蚊胺(DEET)、驱蚊酯等有效成分的驱避剂。

家中安装纱窗、纱门，推荐使用蚊帐防蚊。

六、外出旅行防护

1. 行前准备

查询目的地蚊媒传染病流行情况，科学安排行程。

准备含避蚊胺(DEET)、驱蚊酯等有效成分的驱蚊剂、便携式蚊帐等防护用品。

2. 住宿选择

优先选择有纱窗、纱门的住宿场所。如条件有限，可使用便携式蚊帐。

3. 返程后观察

旅行结束后2周内仍需预防蚊虫叮咬，确保不会因隐性感染，导致基孔肯雅热、登革热等传播。

做好自身的健康监测，如出现发热、皮疹等症状，及时就医并告知旅行史。

七、健康监测与就医

如出现发热、头痛、关节痛、皮疹等症状，应及时就医并告知医

生近期活动史。

防控基孔肯雅热和登革热需以“清积水、灭成蚊、防叮咬”为核心,采取科学灭蚊措施,有效降低蚊媒密度,阻断疾病传播。

公开方式：依申请公开

校对：爱卫处 麦哲恒

（共印 8 份）